

Herken de ransuil



Uiterlijk

Grootte

Middelgrote uil. Lengte 31-37 cm. Spanwijdte 86-100 cm. Kleiner dan bosuil

Kleed

Lijkt op velduil. Geel-bruin verenpatroon met vrij regelmatige strepen. Patroon lijkt op boomschors.

Kenmerken

Lange oorpluimen en fel oranje ogen.

Silhouet

Bij gevaar of verstoring oorpluimen opgezet. Lichaam lang en smal door de veren dicht tegen het lichaam te houden.

Gezicht

Geel-oranje gezichtssluier.

Vleugels

Geen witte achterrand zoals bij velduil.

Man-vrouw

Nauwelijks te onderscheiden. Mannetjes zijn iets kleiner en lichter.

Geluid

Volwassen ransuilen zijn over het algemeen vrij stil.

De zang van een ransuil is een laag, diep "hoe", en wordt elke 2,5 seconde herhaald. Het begint zacht en diep, maar wordt later harder en is tot op 1 km te horen. Het vrouwtje reageert hier op.

De roep is een herhaald, zwak, nasaal, vibrerend "weeh".

De alarmroep is enigszins onstuimig, hees en nasaal "wrack-wrack-wrack". Dit lijkt op een mix van kwaken en blaffen.

De bedelroep van jonge ransuilen is een 'hartverscheurend' en hoog "kie-jèè". Het is langgerekt, jankend en zeer luid, op meer dan 1 km te horen.

Het vleugelklappen Het mannetje vliegt tijdens de balts rond nabij het nest en slaat zijn vleugels onder het lichaam tegen elkaar aan. Dit geeft een luid klappend geluid.

Leefwijze

Algemeen

Ransuilen maken gebruik van (half)open cultuurland, met bosjes, laanbeplanting of erven en een groot aandeel grasland. In heel Nederland komen ze jaarrond voor.

Winterverblijf

In de winter (oktober-maart) verzamelen ransuilen zich in groepen. Ze bezetten overdag een vaste roestplaats, vaak niet ver van een broedlocatie. Roestplaatsen kunnen zowel in loof- als naaldbomen zijn, maar ransuilen hebben de voorkeur voor klimop, hulst en coniferen.

Broedseizoen

In de broedperiode (half maart - begin augustus) zoeken ransuilen vaak kleine, dichte bosjes uit met vrij hoge bomen. Ransuilen bouwen geen eigen nest. Ze gebruiken oude nesten van kraaiachtigen (o.a. ekster of

zwarte kraai), maar ook oude nesten van roofvogels (o.a. buizerd, sperwer), blauwe reiger, houtduif of eekhoorn. Ze maken ook gebruik van kunstmatige nesten.

Broedgedrag

Ransuilen broeden ongeveer vier weken. Na drie weken kunnen de jongen niet vliegen, maar verlaten wel al het nest. Nog twee weken later

vliegen ze wel, maar zijn dan nog vier à vijf weken afhankelijk van de ouders. Zodra ze onafhankelijk zijn, kunnen ze honderden kilometers gaan zwerven.

Voedsel

In de schemering en 's nachts zijn ransuilen actief op zoek naar voedsel. Ze jagen vooral op veldmuizen, maar ook andere muizen en vogels worden gegeten. Ze vliegen zigzaggend boven muizenrijke plekken, zoals bermen.

