

Inrichting uilvriendelijk erf



Uilvriendelijk erf

Het ideale erf ligt in een (half) open cultuurlandschap. In dit landschap zijn houtwallen en -singels, struwelen en bosjes afgewisseld met geleidelijke overgangen naar akkers en graslanden. Het erf heeft dichte, hoge bomen. Ook hier zijn er geleidelijke overgangen en zijn er kruidenrijke stroken. En bovenal is er rust.

Broedseizoen

Een erf biedt mogelijkheid om te broeden en rust om een nest groot te brengen helpt nu het meeste. Dit zijn de belangrijkste tips voor het broedseizoen:

- Voer geen (snoei)werkzaamheden uit van maart tot eind juli.
- Laat oude nesten van kraaiachtigen, roofvogels, houtduiven, reigers en eekhoorns zitten.
- Bied bij ontbreken van natuurlijke nesten een kunstnest aan.
- Maai maximaal een of twee keer per jaar.



Voedselaanbod

Hoe meer voedsel, hoe groter de overlevingskans. Ransuilen eten vooral muizen. Op deze manieren kan je er voor zorgen dat er meer voedsel is:

- Maai minder vaak
- Laat een deel van het gras staan
- Behoud kruidenrijke stroken
- Zorg voor een kruidenrijke zoom op de overgang van houtwal, heg of bos naar grasland.

In de ruimere omgeving kunnen de volgende maatregelen genomen worden:

- Maai ook minder vaak in bermen, dijken en overhoekjes
- Maai graslanden gefaseerd
- Zaai zomergranen in (0,5-20 ha)
- Behoud kruidenrijke akkerranden
- Zorg voor een kruidenrijke zoom op de overgang van houtwal, heg of bos naar grasland.

Roestbomen

Eind augustus verzamelen de ransuilen zich op de roest.

Een roest is een slaapplek, waar de uilen zich overdag schuilhouden. In deze periode zijn dit vaak loofbomen. Het aantal uilen dat zich verzamelt groeit geleidelijk. Zodra de bomen hun blad verliezen in de herfst, trekken de ransuilen naar groenblijvende bomen, zoals naaldbomen, hulst en klimop.

Winterperiode

Het belangrijkste voor ransuilen in de winterperiode is rust. Dit houdt in:

- Zorg voor groenblijvende bomen in de omgeving
- Bewaar afstand van roestplaatsen
- Voorkom lawaai bij roestplaatsen
- Snoei alleen wanneer de roestplaats nog niet (volledig) bezet is (september-oktober)

In de ruimere omgeving kan aanleg van wintervoedselveldjes (tot 15 maart 0,5-20 ha) helpen om de ransuilen ook 's winters van voldoende voedsel te voorzien.

